JUSTE USAGE DES ANTIBIOTIQUES: DES PRINCIPES A LA PRATIQUE

Dr Carine KOUNDÉ
Médecin infectiologue

PLAN

Introduction

1. Généralités sur les antibiotiques
2. Principes de bon usage des antibiotiques
3. Recommandations pratiques

Conclusion

INTRODUCTION

- La RAM : problème majeur de santé publique
- L'utilisation rationnelle des antibiotiques est donc essentielle.
- La pertinence de la prescription des antibiotiques est un facteur clé de la lutte contre l'émergence des résistances bactériennes.
- Rôle majeur des prescripteurs pour la préservation de l'efficacité des antibiotiques

GENERALITES SUR LES ANTIBIOTIQUES

LES BACTERIES- classification

CLASSIFICATION DE LINNE

➔ **Caractéristiques morphologiques et métaboliques**

COLORATION DE GRAM

➔ **Gram positif (bleu-violet)
Gram négatif (rose)**

BESOINS EN OXYGENE

➔ **Aérobic/ Anaérobic**

FLORE

➔ **Commensale **et /ou** pathogène**

COCCI

COCCI EN CHAINE
(streptocoque)

DIPLOCOQUES
(pneumocoque)

COCCI EN AMAS
(staphylocoque)

COCCOBACILLE

BACILLE

BACILLE FUSIFORME

VIBRIONS

SPIRILLE

BORRELIA

TREPONEME

LEPTOSPIRE

Figure : Classification de LINNÉ

FLORE COMMENSALE: MICROBIOTE HUMAIN

Le corps humain est colonisé par de nombreuses bactéries qui constituent la « flore commensale».

Le **microbiote intestinal**, largement impliqué dans les processus de digestion et de défense de l'organisme, est composé d'environ **mille milliards de bactéries +++**

La flore commensale intestinale: **anaérobies >99%**.

FLORE COMMENSALE: MICROBIOTE HUMAIN

- **Effet barrière: contre les bactéries pathogènes** et résistance à la colonisation
- Effet stimulant pour les cellules immunitaires intestinales
- Production de substances antimicrobiennes et le renforcement des cellules intestinales

Chaque site corporel correspond à **une niche écologique spécialisée**

Inhibiteurs de la synthèse des enveloppes bactériennes

- **BETALACTAMINES** : - Pénicillines
 - Céphalosporines
 - Monobactames
 - Carbapénèmes
 - Inhibiteurs de beta lactamase: Amoxicilline + Acide clavulanique
Ticarcilline + Ac clav.
Pipéracilline + tazobactam

- **GLYCOPEPTIDES** : vancomycine et teicoplanine
- **LIPOPEPTIDES** : daptomycine (BGP uniquement) ←
- **FOSFOMYCINE**
- **POLYMYXINES**:

BETALACTAMINES

Pénicillines	Molécules	Spectre utile	Effets secondaires	Principales indications
Pénicillines du groupe A (PO,IV)	Amoxicilline Amoxicilline + Ac clav Ampicilline Ampicilline + Sulbactam	CGP (sauf staphylocoques) : streptocoques, entérocoques BGP : Listéria CGN : Méningocoques Spirochètes : Leptospira, Borrelia, Tréponéma, Anaérobies (sauf Bacteroides) RN : pseudomonas, acinetobacter, corynebactéries	Allergies++ Troubles digestifs rash	- Angines - Érysipèle - Pneumopathies à pneumocoque - Infections systémiques à germes sensibles (IV) : Méningites, Endocardites, Bactériémies... - Prévention de l'endocardite - Listériose
Pénicillines du groupe M	Cloxacilline (PO,IV)	SAMS	Toxicité veineuse	Infections cutanées staphylococciques
Pénicillines du groupe G ET V	Pénicilline G (IV) Pénicilline G retard (IM) Pénicilline V (PO)	Streptocoques Anaérobies (sauf bacteroides) RN : entérocoques ,BGN, Bacteroides	Réactions allergiques	Erysipèle, gangrène gazeuse (G IV) Syphilis primaire, secondaire (retard) Prévention splénectomisé et

INHIBITEURS DE LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES

• AMINOSIDES

Amikacine
Gentamicine
Nétilmicine
Tobramycine

Anaérobies strictes
Chlamydia
mycoplasmes

PHÉNICOLÉS

CYCLINES

ACIDE FUSIDIQUE

OXAZOLIDINONES

MACROLIDES ET APPARENTÉS

- MACROLIDES VRAIS

Amphotericine B
Azithromycine
Clarithromycine
Erythromycine
Josamycine
Midécamycine
Roxithromycine
Spiramycine

- LINCOSAMIDES Clindamycine Lincomycine

- KETOLIDES : Télithromycine

- SYNERGISTINES: Pristinamycine

BGN (majorité) résistants

INHIBITEURS DE LA SYNTHÈSE DES ACIDES NUCLÉIQUES

- **QUINOLONES:** Norfloxacin
Ofloxacin } FQ systémiques
Ciprofloxacine }
- Levofloxacin }
Moxifloxacine } FQ antipneumococciques

- **IMIDAZOLES :** Metronidazole
- **QUINOLEINES:**
- **MUPIROCINE**

Propionibacterium acnes
Actinomyces

INHIBITEURS DE LA SYNTHÈSE DE L'ACIDE FOLIQUE

➤ **SULFAMIDES** : sulfaméthoxazole

Associé au Triméthoprime: qui est un inhibiteur de la dihydrofolate réductase (DHFR) des bactéries.

MECANISMES D'ACTION DES ANTIBIOTIQUES

ÉVITER UNE PRESCRIPTION INUTILE D'ANTIBIOTIQUE (1)

- L'utilisation de test rapide d'orientation diagnostique (TROD) permet d'éviter des traitements antibiotiques inutiles quand il est négatif : test de diagnostic rapide (TDR) dans l'angine, bandelette urinaire dans la cystite.
- La présence de bactéries sur un prélèvement n'est pas synonyme d'infection.
- L'aspect purulent ou muco-purulent des sécrétions nasales n'est pas synonyme d'infection bactérienne.

ÉVITER UNE PRESCRIPTION INUTILE D'ANTIBIOTIQUE (2)

- En l'absence de signes de gravité ou de terrain à risque le traitement antibiotique n'est pas urgent.
- En cas de doute sur l'utilité d'une prescription d'antibiotique, il est préférable de surseoir et de réévaluer à 48 heures.
- Certaines infections bactériennes ne relèvent pas d'une antibiothérapie mais d'une intervention chirurgicale (le drainage d'un abcès....).

ANTIBIOTIQUES NON RECOMMANDÉS (1)

Fièvre isolée

Augmentation isolée de la CRP

Infections ORL

- rhinopharyngite aiguë, angine virale
- épisode grippal
- otite moyenne aiguë (OMA) de l'enfant de plus de 2 ans
- otite moyenne aiguë congestive et otite séromuqueuse
- otite externe (en dehors de l'otite externe maligne du diabétique)
- otorrhée sur drain
- sinusite maxillaire de l'enfant ou de l'adulte quand l'évolution sous traitement symptomatique est favorable.

ANTIBIOTIQUES NON RECOMMANDÉS (2)

Infections respiratoires basses

- bronchite aiguë de l'adulte sain, y compris chez le fumeur ;
- exacerbation aiguë d'une bronchite chronique simple (sans obstruction) ;
- exacerbation aiguë d'une bronchite chronique obstructive légère ou modérée, en l'absence de sécrétions purulentes ;
- bronchiolite ou trachéobronchite d'évolution favorable dans les 72 heures, en l'absence d'OMA associée ;

ANTIBIOTIQUES NON RECOMMANDÉS (3)

Urinaire

les bactériuries asymptomatiques (colonisation urinaire) y compris sur sonde **en dehors de la grossesse et d'une intervention urologique programmée.**

Cutané: - Furoncle

- Abscès de paroi

- La veinite simple

Digestif: syndrome cholériforme ou gastroentérique non sévère.

Principes de bon usage des antibiotiques

- **Etablir le bon diagnostic**

anamnèse + examen clinique + examens paracliniques ++++++

- **Prescrire des antibiotiques seulement si nécessaire**

Si nécessaire: - bonne molécule

- bonne dose

- voie d'administration la plus indiquée

- la durée la plus appropriée au site et au type d'infection

Se poser les bonnes questions

- **Quand prescrire un antibiotique?**
- **Un prélèvement bactériologique est-il nécessaire avant?**
- **Quel(s) antibiotique(s) utiliser?**
- **Une association d'antibiotiques est-elle nécessaire?**
- **Comment prescrire une antibiothérapie?**
- **Le recours au drainage est-il nécessaire?**
- **Comment surveiller l'efficacité?**

Quand prescrire un antibiotique?

➤ Infection d'origine bactérienne

- **Probable** (antibiothérapie probabiliste)

Diagnostic clinique uniquement (ambulatoire) ou dans l'attente du résultat microbiologique

- **Documentée** (antibiothérapie documentée , infection bactérienne confirmée microbiologiquement)

Quand prescrire un antibiotique? (2)

- **Antibiothérapie prophylactique**: vise à prévenir une infection bactérienne dans des circonstances définies.
- **Antibiothérapie curative**: infection bactérienne caractérisée cliniquement.

Un prélèvement bactériologique est-il nécessaire avant?

Indispensable en cas :

- **Infection grave**: pronostic vital ou fonctionnel
- **Bactéries** suspectées **variées** de **sensibilité inconstante**
- **Incertitude** diagnostique

Superflu en cas :

Diagnostic clinique **aisé**: impétigo, cystite, érysipèle

Sensibilité des bactéries aux ATB **bien connue** : pneumonie

Quel(s) antibiotique(s) utiliser? (1)

5 paramètres à prendre en compte :

- ✓ **Site de l'infection:** obtenir des concentrations efficaces
- ✓ **Bactérie responsable:** épidémiologie et clinique (ex: infection urinaire=BGN)
- ✓ **Terrain:** allergie, âge, grossesse, atteinte rénale ou hépatique, cardiopathie, atcd de prescription d'AB,....

Quel(s) antibiotique(s) utiliser? (2)

- ✓ **Coût écologique** sélection de bactéries résistantes dans la flore commensale. A activité comparable, choisir l'AB dont l'impact sur la flore est le plus faible ++++++
- ✓ **Coût économique:** privilégier le moins cher à activité comparable.

Une association d'antibiotiques est-elle nécessaire?

Utile en cas:

- **Prévention de la résistance** : (antituberculeux, Fluoroquinolone)
- Obtenir une **bactéricidie accrue** (bêtalactamine + aminoside)
- **Elargir le spectre** antibactérien (urgence, infection grave, polymicrobienne,)
- **Terrain fragile** : neutropénie, germe noso

Comment prescrire une antibiothérapie?

- **Posologie:** adaptée à la gravité de l'infection, la nature du foyer, comorbidités
 - **Dose unitaire** (concentration dépendante)
 - **Dose répétée** (temps dépendant)
 - **Dose de charge ?**
- **Voie d'administration :** **IV**, PO, IM, SC, Locale
- **Durée** (de plus en plus courte)

Le recours au drainage est-il nécessaire?

➤ **Toute collection purulente ou suppurations localisées**

- Ponction évacuatrice (pleurésie purulente)
- Drainage chirurgical (arthrite septique, péricardite purulente, péritonite bactérienne)

➤ **Infections canalaies**

- Levée d'obstacle: angiocholite aiguë lithiasique, pyélonéphrite aiguë avec lithiase.

coupler à une antibiothérapie efficace

Comment surveiller l'efficacité?

➤ Critères de jugement efficacité

- ✓ Amélioration clinique (disparition fièvre dans les 48-72h+++)
- ✓ Stérilisation foyer infectieux
- ✓ Normalisation des anomalies biologiques (hyperleucocytose, PCT, CRP)
- ✓ Régression anomalies radiologiques

REEVALUATION

analyser les données microbiologiques
(contamination? colonisation? Infection?)

Spectre d'activité → Désescalade? Escalade? Interruption?

- Réévaluation

éclairée: → rechercher des effets indésirables

déterminer la voie d'administration et la durée de traitement

Recommandations pratiques

INFECTIONS URINAIRES (1)

➤ Cystite aigue simple de la femme

Dépister l'infection par une bandelette

- leucocyturie et nitrites négatives: éliminer l'infection urinaire dans 98% des cas.
- Pas d'ECBU si cystite non compliquée, non récidivante et hors grossesse.
- Germe probable : E. coli (98% des cas) Proteus, Klebsiella

INFECTIONS URINAIRES (2)

Cystite aigue simple de la femme

- Fosfomycine-trométamol: 3g en PU (1ere intention)
- Pivmecillinam : 400 mg 2 fois/j/3 jours (2^{ième} intention)
- Nitrofurantoin 100mg/08h pendant 5j

INFECTIONS URINAIRES (3)

➤ **Pyélonéphrite aigue communautaire non compliquée de la femme**

Rechercher le degré d'urgence ++++

Si sévère: traitement probabiliste immédiat après les prélèvements

Prélèvements: ECBU si bandelette positive + pour nitrite et/ou leucocytes

80% E. coli, Proteus, Klebsiella

INFECTIONS URINAIRES (4)

➤ Pyélonéphrite aigue communautaire non compliquée de la femme

Résistance élevée aux fluoroquinolones dans certains pays

Traitement probabiliste:

- **Quinolones** PO pendant 7j :

Ciprofloxacin: 500-750mg x2/j

Levofloxacin: 500mg/24h

}
} Si non prescription de fluoroquinolones
dans les 6 mois précédents.

- **Ou C3G** en IV pdt 2-4j : cefotaxime: 1-2g x 3/j ou ceftriaxone: 1-2g/j

Puis relais per os selon les **résultats de l'antibiogramme.**

Durée totale de traitement: 10-14j

PNEUMONIES (1)

➤ Pneumonie aigue communautaire (PAC) de l'adulte sain

• Degré d'urgence:

si sévérité: trouble de la conscience, PAS < 90mmHg FC: 120/min
FR: > 30/min hypothermie (< 36°) ou hyperthermie (> 40°C)

Débuter un traitement en urgence +++++

- Radiographie thoracique +++++ et au moins une hémoculture
- Germes probables: pneumocoque +++, Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila (rare)

PNEUMONIES (2)

- Etiologie bactérienne: varie selon le terrain et les comorbidités

Pneumocoque +++

Haemophilus influenzae

Légionella

SARM (pneumonie nécrosante avec hémoptysie et/ou leucopénie)

PNEUMONIES (3)

Traitement probabiliste:

- **Pneumonie communautaire de l'adulte sain sans signe de gravité** -
Amoxicilline PO: 1gx3/j/7j
Si allergie aux betalactamines: Pristinamycine en PO: 1g x 3/J/7J
ou Telithromycine PO: 800mg/j/5j
- **PAC du sujet âgé ou avec comorbidités**
-Amoxi-clav 1g x 3/j/ 7j ou C3G: ceftriaxone 1-2g/j ou cefotaxime: 1g x3/j/7j
Si allergie aux betalactamines: levofloxacin 0.5 à 1g/j/7j (Si FQ > 3mois)

PNEUMONIES (4)

- PAC avec signes de gravité

Bithérapie pdt 7-10j: ceftriaxone ou cefotaxime + macrolides IV ou FQ (Levofloxacin ou moxifloxacin)

- Suivi:
 - Réévaluation systématique à 48- 72h
 - Si amélioration passer à la VO si IV initiale

Conclusion

- L'usage inapproprié des antibiotiques peut avoir des conséquences désastreuses.
- L'avenir des antibiotiques dépend de nous tous.
- Si chacun partage cette même exigence d'une juste utilisation des antibiotiques, il sera alors possible:
 - d'améliorer la qualité de la prise en charge,
 - de réduire les consommations injustifiées,
 - d'alléger la pression de sélection,
 - et de ralentir le développement des résistances bactériennes.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Sous le haut parrainage des

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
REPUBLIQUE DU BÉNIN

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
REPUBLIQUE DU BÉNIN

SOCIÉTÉ
BÉNINOISE DE
PATHOLOGIE
INFECTIEUSE ET
TROPICALE

La Société Béninoise de Pathologie Infectieuse
et Tropicale (SOBEPIT)
Organise

1ères JOURNÉES NATIONALES D'INFECTIOLOGIE du Bénin (JNI)

Thème :

Qualité et sécurité des soins
en infectiologie : un défi
de développement
dans les pays à
ressources
limitées

SOUS-THÈMES

- 1 COVID-19 : bilan, leçons apprises et perspectives
- 2 Approche « One-health » dans la lutte contre les épidémies
- 3 Infectiologie transversale
- 4 Microbiologie appliquée
- 5 Communications libres

FRAIS D'INSCRIPTION

Enseignants/Chercheurs : 40 000 FCFA
Spécialistes : 30 000 FCFA
Généralistes/Doctorants/DES : 20 000 FCFA
Étudiants/Paramédicaux : 15 000 FCFA
Stands : 500 000 FCFA
Symposium : 1 000 000 FCFA

DATE

01-03
Septembre 2022

LIEU

Palais des congrès
de Cotonou

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES ABSTRACTS

10 Juin 2022

Format : Introduction énonçant les objectifs, méthodes, résultats, conclusion, mots clés (3-4).
Police : Arial, taille 10, interligne 1,5 ; longueur 250 mots, langue : français

Adresse mail de soumission des résumés : info.sobepit.bj@gmail.com
Inscription : Dr. Axelle GANSOU (+229) 97877723 / Dr. Tokpanou KOUDJO (-229)97605602
Pour tout renseignement : (+229) 95283344 / 97605602